



DIAGNOSTICUM

DR. SOCHOR GERSTHOF

Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT)

Digitale Microdose-Mammographie

Nuklearmedizin (Szintigraphie)

Digitale Röntgendiagnostik

Herz-CT und Dental-CT

Computer-Tomographie

Ultraschall Farbduplex

Knochendichtemessung

PatientInneninformationsblatt IRRIGOSKOPIE

Name des Patienten/der Patientin: _____ **Datum:** _____
(Bitte ausfüllen!)

IRRIGOSKOPIE

Röntgenuntersuchung des Dickdarms

Die Irrigoskopie dient zur Untersuchung des Dickdarms bei Verstopfung, Durchfällen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Entzündungen, Divertikeln, zur postoperativen Kontrolle und bei anderen Indikationen.

Untersuchungsablauf:

Die Irrigoskopie dauert im Normalfall ca. 20 Minuten und ist nicht schmerzhaft. Sie erhalten mittels eines Darmrohres, das nur wenige cm eingeführt wird, einen Kontrastmitteleinlauf. Das Kontrastmittel (KM) ist vorgewärmt, sodass Sie das Einlaufen des KMs (abgesehen von einem leichten Stuhldrang) nicht spüren werden. Wenn der Darm ausreichend dargestellt ist, wird das KM wieder abgelassen, was Sie ebenfalls nicht spüren werden. Um nun eine optimale Beurteilbarkeit des Dickdarms zu erreichen, wird mittels eines kleinen Ballons etwas Luft in den Darm verabreicht, was ein Blähungsgefühl verursacht. Der Arzt fertigt sodann Röntgenaufnahmen des Dickdarms an. Anschließend wird das Darmrohr entfernt und Sie können auf die Toilette gehen.

Das Kontrastmittel verursacht keine Nebenwirkungen und Sie können anschließend normal essen und trinken. Ihr Stuhl wird einige Tage eine weiße Färbung aufweisen. Dies ist das restliche KM, welches nun ausgeschieden wird.

Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft? Ja Nein

Unterschrift des/der Patienten/in Name und Unterschrift des Arztes

*Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Name und Unterschrift der MTF/RT
(bei PatientInnen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)*

Datum/Uhrzeit